

KBC06

Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1978*

Horské jeřábové porosty

Tabulka 4, sloupec 6 (str. 151)

Orig. (Oberdorfer 1978): *Piceo-Sorbetum aucupariae*
Oberd. 73 (*Picea abies*)

Syn.: *Sorbetum aucupariae* Aichinger 1952 (§ 2b, nomen nudum), *Piceo-Sorbetum aucupariae* (Aichinger 1952) Oberdorfer 1973 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: *Picea abies*, *Sorbus aucuparia*; *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris dilatata*, *Phegopteris connectilis*, *Ranunculus platanifolius*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*; *Cephalozia bicuspidata*, *Dicranum montanum*, *D. scoparium*, *Diplophyllum albicans*, *Lophozia ventricosa*, *Paraleucobryum longifolium*, *Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*, *Racomitrium sudeticum*, *Scapania nemorea*

Konstantní druhy: *Picea abies*, *Rubus idaeus*, ***Sorbus aucuparia***; *Athyrium filix-femina*, ***Avenella flexuosa***, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris dilatata*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Senecio nemorensis* agg. (převážně *S. ovatus*), ***Vaccinium myrtillus***; *Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*

Dominantní druhy: ***Sorbus aucuparia***; ***Avenella flexuosa***, *Calamagrostis villosa*, *Vaccinium myrtillus*

Formální definice: *Sorbus aucuparia* pokr. > 25 % AND skup. ***Vaccinium myrtillus*** NOT skup. *Veratrum*

* Zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý


lobelianum NOT *Abies alba* pokr. > 25 % NOT
Betula pendula pokr. > 25 % NOT *Corylus avellana*
 pokr. > 25 % NOT *Fagus sylvatica* pokr. > 25 %
 NOT *Larix decidua* pokr. > 25 % NOT *Picea abies*
 pokr. > 25 % NOT *Pinus sylvestris* pokr. > 5 %
 NOT *Prunus spinosa* pokr. > 25 % NOT *Quercus*
petraea agg. pokr. > 5 % NOT *Quercus robur* pokr.
> 5 %

europaea). Časté jsou některé pasekové bylinky (např. *Epilobium angustifolium* a *Fragaria vesca*), které však mívají jen malou pokryvnost. Rumištní a nitrofilní lemové druhy jsou vzácné, dosti hojně jsou však druhy úhorů a ladem ležících půd, např. *Galeopsis tetrahit* a *Holcus mollis*. V porostech se obvykle vyskytuje jen 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m². Mechové patro je zpravidla dobře vyvinuto a obsahuje mechy a játrovky typické pro horské smrkové lesy.

Struktura a druhové složení. Kromě dominantního, většinou keřovitého rostoucího jeřábu ptačího (*Sorbus aucuparia*) se na skladbě těchto porostů podílejí další dřeviny nenáročné na obsah živin v půdě, zejména *Betula pendula*, *Picea abies* a *Rubus idaeus*. Porosty jsou obvykle řídké a mezenaté nebo jen volně skupinovité a jejich výška silně kolísá podle sukcesního stáří. V bylinném patře převládají acidofilní trávy (např. *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Holcus lanatus* a *Nardus stricta*), keříčky (např. *Vaccinium myrtillus*), kapradiny (např. *Dryopteris dilatata*) a nenáročné lesní geofyty (např. *Oxalis acetosella* a *Trientalis*


Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje od chladných vrchovin do hor, nejčastěji na pasekách po smrkových kulturách a kyselých bučinách. Vzácně osídluje také skalnatá místa nebo balvanové rozpady obklopené lesem. Ve vyšších pohořích se objevuje i mimo les na terasových mezích a kameniných snosech z horských luk.

Dynamika a management. *Piceo-Sorbetum* je zpravidla krátkověké společenstvo, které během sukcese na pasekách ustupuje ve prospěch vzrůstajících stromků, nejčastěji břízy a smrku. Dlouho-



Obr. 44. *Piceo abietis-Sorbetum aucupariae*. Porosty jeřábu ptačího (*Sorbus aucuparia*) a smrku ztepilého (*Picea abies*) na starých odvalech po těžbě rud u Horní Blatné v Krušných horách. (M. Chytrý 2012.)

Fig. 44. A stand of *Sorbus aucuparia* and *Picea abies* on old mine spoil heaps near Horní Blatná in the Krušné hory Mountains, north-western Bohemia.



Obr. 45. Rozšíření asociace KBC06 *Piceo abietis-Sorbetum aucupariae*; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření této asociace.

Fig. 45. Distribution of the association KBC06 *Piceo abietis-Sorbetum aucupariae*; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution of this association.

dobé porosty se v lesním prostředí tvoří jen vzácně na skalnatých svazích nebo sutích, kde je konkurence stromů omezena nepříznivým stanovištěm. Porosty stálé zmlazované častým vytíráním se vyskytují rovněž na okrajích horských luk. V posledních stoletích před naším letopočtem však mohly porosty snad totičně s touto asociací tvořit přirozenou velkoplošnou vegetaci ve vrcholových částech Hrubého Jeseníku na místě dnešních horských holí. Podle uhlíkových analýz půd zde totič byla vegetace se smrkem a světlomilnými dřevinami jeřábem, břízou, vrbou a jalovcem (J. Novák et al. 2010).

Rozšíření. Tato asociace je rozšířena v podhoráských a horských oblastech střední Evropy. Byla zaznamenána v Německu (Oberdorfer in Oberdorfer 1993: 299–328, Weber 1999) a Rakousku (Forstner 1984, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), její rozšíření je však pravděpodobně širší a může se vyskytovat i v severní Evropě. Z České republiky je k dispozici jen málo fytocenologických snímků, které byly v literatuře uvedeny pod různými jmény. Pocházejí zejména z Krkonoš (Krátiký, Kurz, Skuhrovec, vše nepubl.), Českého Švýcarska (Skuhrovec, nepubl., Vondráček, nepubl.), Liberce (Višňák 1992), Jizerských hor (Višňák 2012), Ještědského hřebetu (P. Petřík 2000), Trutnovska (Gregor, nepubl.), Křivoklátska (Kolbek et al. 2003a), Hanu-

šovicka (J. Král, nepubl.) a Moravskoslezských Beskyd (Kočí, nepubl.).

Variabilita. Porosty na pasekách a lesních skalnatých svazích bývají druhově velmi chudé a převažují v nich acidofity, zatímco v porostech rostoucích mimo les jsou součástí bylinného patra četné luční druhy, jako jsou *Festuca rubra*, *Hypericum maculatum* a *Rumex acetosa*.

Hospodářský význam a ohrožení. Porosty asociace *Piceo-Sorbetum* se zpravidla pokládají za bezcenný nálet. Mají však význam pro ochranu nejmladších vývojových stadií lesa před extrémým klimatem a konkurencí trav, jako je *Calamagrostis villosa*. Cenné jsou zejména porosty na horských holinách, např. v Krkonošských horách, které jsou přípravným stadiem lesa. Společenstvo ustupuje vlivem eutrofizace lesů, intenzifikace lesnictví a absence vhodného managementu nelesních stanovišť.

■ **Summary.** *Piceo-Sorbetum* is dominated by *Sorbus aucuparia*, growing mostly as a shrub, which is accompanied by other woody plants tolerant to nutrient-poor soils, such as *Betula pendula*, *Picea abies* and *Rubus idaeus*. The herb layer consists of acidophilous grasses, dwarf shrubs and dicot herbs. This is a short-lived community occurring on clearings of acidophilous beech forests or spruce plantations in the submontane and montane belts, where it is

being gradually replaced by successional stands of birch or spruce. In some places it is also found on rock outcrops and talus slopes or on successional sites in the open landscape.

Tabulka 4. Synoptická tabulka asociací mezofilních a xerofilních křovin a akátin (třída Rhamno-Prunetea, část 2: *Sambuco-Salicion capreae*, *Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae*, *Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae*, *Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae* a *Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae*) a subalpínské klečové vegetace (*Roso pendulinae-Pinetea mugo*).

Table 4. Synoptic table of the associations of mesic and xeric scrub and *Robinia* groves (class Rhamno-Prunetea, part 2: *Sambuco-Salicion capreae*, *Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae*, *Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae*, *Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae* and *Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae*) and subalpine krummholz vegetation (*Roso pendulinae-Pinetea mugo*).

- 1 – KBC01. *Ribeso alpini-Rosetum penduliniae*
- 2 – KBC02. *Rubetum idaei*
- 3 – KBC03. *Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae*
- 4 – KBC04. *Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae*
- 5 – KBC05. *Salicetum capreae*
- 6 – KBC06. *Piceo abietis-Sorbetum aucupariae*
- 7 – KBD01. *Sambucetum nigrae*
- 8 – KBD02. *Lycietum barbari*
- 9 – KBD03. *Sambuco nigrae-Aceretum negundo*
- 10 – KBE01. *Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae*
- 11 – KBE02. *Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae*
- 12 – KBF01. *Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae*
- 13 – KBG01. *Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae*
- 14 – KCA01. *Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo*
- 15 – KCA02. *Adenostylo alliariae-Pinetum mugo*

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Počet snímků	10	41	11	9	26	10	40	25	8	152	78	39	18	25	2
Počet snímků s údaji o mechovém patře	8	24	8	3	14	10	34	24	0	134	72	35	18	20	2

Keřové a stromové patro

Ribeso alpini-Rosetum penduliniae

<i>Ribes alpinum</i>	60	1
<i>Rosa pendulina</i>	40	.	.	11
<i>Lonicera nigra</i>	20	1

Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae

<i>Corylus avellana</i>	20	2	9	100	12	.	3	.	13	8	5	5	.	.	.
<i>Rhamnus cathartica</i>	20	.	.	22	.	.	.	12	.	1	3

Salicetum capreae

<i>Betula pendula</i>	10	15	27	22	58	.	3	.	13	1	3	3	6	.	.
<i>Populus tremula</i>	.	7	9	22	31	.	3	.	.	3	3	3	.	.	.

Piceo abietis-Sorbetum aucupariae

<i>Sorbus aucuparia</i>	50	15	36	22	19	100	.	.	.	1	6	.	.	40	100
<i>Picea abies</i>	.	12	27	56	15	80	3	.	.	1	3	3	.	44	100

Sambucetum nigrae

<i>Prunus domestica</i>	.	2	15	4
-------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Lycietum barbari

<i>Lycium barbarum</i>	5	100	.	.	1
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Tabulka 4

Tabulka 4 (pokračování ze strany 151)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Syringa vulgaris</i>	.	.	9	.	.	.	3	20	.	1	1
<i>Ailanthus altissima</i>	3	12	.	1
<i>Sambuco nigrae-Aceretum negundo</i>															
<i>Acer negundo</i>	5	.	100	1
<i>Fraxinus angustifolia</i>	25
<i>Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae</i>															
<i>Ribes uva-crispa</i>	10	.	9	11	15	.	8	.	.	34	21	13	11	.	.
<i>Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae</i>															
<i>Rosa canina</i> agg.	.	2	9	.	19	.	15	16	25	9	26	8	61	.	.
<i>Cotoneaster integrerrimus</i>	20	2	12	3	33	.	.	.
Diagnostické druhy pro dvě a více asociací															
<i>Lonicera xylosteum</i>	50	.	9	33	4	2
<i>Rubus idaeus</i>	40	100	82	44	58	60	8	.	13	5	1	5	.	24	50
<i>Sambucus racemosa</i>	30	27	100	33	42	10	.	.	.	2	3	3	11	.	.
<i>Salix caprea</i>	.	10	45	22	100	.	8
<i>Sambucus nigra</i>	10	15	18	.	12	.	100	32	13	82	51	21	6	.	.
<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	16	13	100	100	100	100	.	.
<i>Pinus mugo</i>	100	100	.
Ostatní druhy s vyšší frekvencí															
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	10	51	64	22	19	10	15	4	25	46	56	31	39	.	.
<i>Prunus spinosa</i>	.	2	.	.	8	.	5	4	.	11	27	3	22	.	.
<i>Euonymus europaeus</i>	.	.	.	22	.	.	8	.	.	16	10	.	6	.	.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	7	9	22	27	30	5	.	.	4	1	3	.	4	.
<i>Acer campestre</i>	10	.	.	.	8	.	.	.	25	6	8	.	11	.	.
<i>Quercus robur</i>	10	2	.	.	8	4	6	3	22	.	.
<i>Rubus caesius</i>	.	2	.	.	4	.	10	4	38	4	1	8	.	.	.
<i>Carpinus betulus</i>	20	2	9	11	15	3	3	.	6	.	.
<i>Fagus sylvatica</i>	10	10	18	11	8	30	3
<i>Pinus sylvestris</i>	.	2	.	11	.	.	3	.	.	1	5	5	22	.	.
Bylinné patro															
<i>Ribeso alpini-Rosetum pendulinae</i>															
<i>Polypodium vulgare</i> agg.	50	.	.	11	.	10	.	.	.	4
<i>Rubetum idaei</i>															
<i>Calamagrostis epigejos</i>	.	68	45	11	27	.	10	.	25	2	17	54	11	.	.
<i>Seneconii fuchsii-Sambucetum racemosae</i>															
<i>Atropa bella-donna</i>	.	.	18
<i>Seneconii fuchsii-Coryletum avellanae</i>															
<i>Knautia maxima</i>	.	.	.	22
<i>Melica nutans</i>	20	5	45	78	15	10	.	.	.	2	1
<i>Dryopteris filix-mas</i>	50	12	45	89	15	20	3	.	.	7	24	.	.	.	50

Tabulka 4 (pokračování ze strany 152)

Slopec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Asarum europaeum</i>	.	.	.	67	4	1
<i>Epilobium montanum</i>	20	7	27	56	35	.	3	.	.	1
<i>Impatiens noli-tangere</i>	40	5	18	78	12	.	3	.	.	3	1
<i>Mercurialis perennis</i>	30	2	36	67	8	1	3
<i>Senecio nemorensis</i> agg.	30	37	82	89	38	60	3	.	.	1	1	.	.	8	100
<i>Hepatica nobilis</i>	.	.	9	44
Piceo abietis-Sorbetum aucupariae															
<i>Phegopteris connectilis</i>	60	.	.	.	1
<i>Dryopteris dilatata</i>	20	10	27	22	23	80	.	.	.	3	1	10	.	24	50
<i>Avenella flexuosa</i>	.	22	18	11	4	100	.	.	.	3	18	8	17	76	.
<i>Streptopus amplexifolius</i>	20
<i>Ranunculus platanifolius</i>	20
Lycietum barbari															
<i>Asperugo procumbens</i>	3	12
<i>Anthriscus cerefolium</i>	3	12	.	3
<i>Bromus sterilis</i>	15	32	.	27	4	26	.	.	.
Sambuco nigrae-Aceretum negundo															
<i>Humulus lupulus</i>	.	.	9	.	.	.	8	4	63	13	1	15	.	.	.
<i>Parthenocissus inserta</i>	8	.	25
<i>Carduus crispus</i>	10	4	38	7	3	8	11	.	.
<i>Sympyotrichum novi-belgii</i> agg.	5	.	25	1
<i>Torilis japonica</i>	.	2	.	11	.	.	5	.	38	4	5	10	.	.	.
Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae															
<i>Chaerophyllum temulum</i>	.	2	.	11	8	.	18	20	.	40	1	10	17	.	.
Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae															
<i>Fallopia dumetorum</i>	5	4	13	15	31	13	22	.	.
<i>Poa nemoralis</i>	20	39	45	78	35	10	8	8	13	39	97	44	78	.	.
Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae															
<i>Melica transsilvanica</i>	2	5	13	67	.	.
<i>Verbascum lychnitis</i>	1	1	3	50	.	.
<i>Arabidopsis arenosa</i>	20	6	17	5	39	.	.
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	10	6	10	10	56	.	.
<i>Verbascum densiflorum</i>	17	.	.
<i>Aurinia saxatilis</i>	10	1	.	.	28	.	.
<i>Asplenium septentrionale</i>	4	.	28	.	.	.
<i>Festuca pallens</i>	3	.	39	.	.	.
<i>Allium vineale</i>	8	8	.	17	.	.	.
<i>Stipa pulcherrima</i>	3	17
Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo															
<i>Homogyne alpina</i>	72	50	.
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	.	.	.	4	30	48	.	.
<i>Gentiana asclepiadea</i>	.	.	.	8	20	24	50	.

Tabulka 4

Tabulka 4 (pokračování ze strany 153)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Adenostylo alliariae-Pinetum mugo															
<i>Thelypteris limbosperma</i>	100
<i>Athyrium distentifolium</i>	.	5	.	.	4	20	24	100
Diagnostické druhy pro dvě a více asociací															
<i>Epilobium angustifolium</i>	.	63	55	.	38	20	5	.	.	.	1	3	.	.	.
<i>Vaccinium myrtillus</i>	20	15	9	11	8	100	1	.	.	88	50
<i>Calamagrostis villosa</i>	.	5	.	.	4	70	76	50
<i>Bryonia alba</i>	4	.	18	28	.	.	3
<i>Ballota nigra</i>	53	72	.	39	9	26	.	.	.
<i>Chelidonium majus</i>	10	.	.	11	8	.	45	24	13	64	42	41	11	.	.
<i>Geum urbanum</i>	.	7	.	33	19	.	53	16	75	76	26	23	17	.	.
<i>Trientalis europaea</i>	4	20	72	100
Ostatní druhy s vyšší frekvencí															
<i>Urtica dioica</i>	40	63	91	56	65	10	98	40	100	85	18	28	.	.	.
<i>Galium aparine</i>	10	39	18	11	19	.	55	56	75	86	42	44	39	.	.
<i>Impatiens parviflora</i>	50	12	9	11	8	.	20	.	13	50	55	15	22	.	.
<i>Anthriscus sylvestris</i>	.	29	9	.	19	.	38	24	13	57	12	10	.	.	.
<i>Geranium robertianum</i>	30	10	18	67	23	.	5	.	25	45	32	15	28	.	.
<i>Galeopsis tetrahit</i> agg.	.	20	27	11	23	10	10	4	.	30	54	26	28	4	.
<i>Taraxacum sect. Taraxacum</i>	.	5	27	.	23	.	28	24	25	32	18	13	11	.	.
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	20	.	.	15	.	5	28	13	19	21	74	6	.	.
<i>Poa trivialis</i>	.	20	9	.	8	.	33	.	.	39	3	8	.	.	.
<i>Elymus repens</i>	.	12	.	.	15	.	43	60	25	18	6	26	.	.	.
<i>Moehringia trinervia</i>	.	22	27	22	4	.	3	.	.	25	19	18	11	.	.
<i>Stellaria media</i> agg.	.	2	18	.	4	.	23	4	.	29	15	13	6	.	.
<i>Dactylis glomerata</i>	.	24	36	.	38	.	25	36	25	11	4	26	.	.	.
<i>Alliaria petiolata</i>	.	2	9	22	.	.	15	4	25	30	8	5	11	.	.
<i>Fraxinus excelsior</i>	30	5	18	11	15	.	18	.	.	18	17	3	11	.	.
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	.	5	9	.	8	.	5	.	38	21	9	26	.	.	.
<i>Poa pratensis</i> agg.	.	7	18	.	4	.	13	20	25	15	6	26	6	.	.
<i>Fallopia convolvulus</i>	.	2	9	.	.	.	10	24	.	11	19	10	39	.	.
<i>Artemisia vulgaris</i>	19	.	50	60	13	3	.	3	.	.	.
<i>Hypericum perforatum</i>	.	17	9	.	15	.	3	4	13	1	22	3	44	.	.
<i>Veronica hederifolia</i> agg.	5	24	.	15	6	8	.	.	.
<i>Aegopodium podagraria</i>	.	5	9	44	19	.	23	8	25	9
<i>Oxalis acetosella</i>	30	24	36	56	15	70	.	.	.	2	100
<i>Stellaria holostea</i>	20	10	9	44	8	7	10	8	17	.	.
<i>Viola arvensis</i>	3	4	.	4	19	18	28	.	.
<i>Lamium album</i>	4	.	33	8	.	11
<i>Fragaria vesca</i>	.	20	18	44	15	3	8	5	6	.	.
<i>Lamium maculatum</i>	20	.	9	11	.	.	10	.	13	13	3	.	6	.	.
<i>Chenopodium album</i> agg.	.	.	9	.	.	.	8	28	13	7	4	10	11	.	.
<i>Athyrium filix-femina</i>	10	20	55	56	15	50	1	.	.	4	.
<i>Agrostis capillaris</i>	.	27	27	.	15	20	3	.	.	1	4	8	.	.	.
<i>Cirsium arvense</i>	.	17	18	.	15	.	15	8	38	1	1	5	.	.	.
<i>Euphorbia cyparissias</i>	4	.	2	10	10	67	.	.	.
<i>Carex muricata</i> agg.	.	.	9	.	4	7	8	21	.	.	.
<i>Hylotelephium telephium</i> agg.	10	.	.	.	4	.	.	4	.	3	14	8	22	.	.

Tabulka 4 (pokračování ze strany 154)

Slopec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Lapsana communis</i>	.	2	9	22	4	.	8	.	.	7	6
<i>Convolvulus arvensis</i>	.	2	13	28	13	1	.	8	17	.	.
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	50	15	36	33	8	10
<i>Galeobdolon luteum</i> agg.	40	2	27	56	12	2	1
<i>Rumex obtusifolius</i>	.	.	18	.	19	.	23	.	13	2
<i>Dryopteris carthusiana</i>	20	7	27	33	4	1	.	.	.	20	50
<i>Veronica chamaedrys</i> agg.	.	7	9	22	15	.	3	.	13	4	3
<i>Lactuca serriola</i>	20	.	4	9	.	6	.	.	.
<i>Polygonatum odoratum</i>	3	12	.	28	.	.	.
<i>Ranunculus repens</i>	.	15	.	11	31	.	8	.	.	1
<i>Deschampsia cespitosa</i>	.	15	18	11	23	10	4	.
<i>Luzula luzuloides</i>	.	5	18	33	4	20	.	.	.	1	1	.	.	16	.
<i>Glechoma hederacea</i> agg.	.	5	20	4	13	2
<i>Mycelis muralis</i>	10	5	18	33	8	2	3
<i>Cirsium palustre</i>	.	12	18	.	23	.	3
<i>Pulmonaria officinalis</i> agg.	10	.	.	56	4	.	5	.	.	3
<i>Stellaria nemorum</i>	20	.	9	11	4	20	3	.	13	2	50
<i>Prenanthes purpurea</i>	.	5	18	.	4	40	16	.
<i>Campanula trachelium</i>	.	.	9	22	8	.	8	.	.	2	1
<i>Descurainia sophia</i>	3	28	.	2	.	3	.	.	.
<i>Milium effusum</i>	10	10	18	22	4	10
<i>Galium odoratum</i>	10	2	27	22	12	.	3
<i>Solidago virgaurea</i>	.	.	.	22	4	30	20	.
<i>Scrophularia nodosa</i>	.	5	36	11	4	1	1	3	.	.	.
<i>Atriplex sagittata</i>	10	20	.	1
<i>Anthericum liliago</i>	8	.	22	.	.	.
<i>Centaurea stoebe</i>	12	.	.	.	3	33	.	.	.
<i>Sympytum officinale</i>	.	.	9	11	.	.	5	.	50	1
<i>Campanula persicifolia</i>	.	.	.	22	1	4	3	6	.	.
<i>Lysimachia nummularia</i>	.	2	.	.	12	.	3	.	38	1
<i>Galeopsis speciosa</i>	.	2	9	22	25	2
<i>Anemone nemorosa</i>	.	10	.	22	4	10	.	.	.	1
<i>Galium sylvaticum</i>	30	.	.	22	8	1
<i>Asplenium trichomanes</i>	20	.	.	11	1	4	.	6	.	.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	20	2	9	11	.	20	50
<i>Carex humilis</i>	3	.	33	.	.	.
<i>Silene dioica</i>	.	5	9	.	4	20	.	.	.	1	.	.	4	.	.
<i>Potentilla reptans</i>	5	.	25	1	.	3	.	.	.
<i>Bistorta officinalis</i>	4	24	.	.
<i>Polygonatum verticillatum</i>	10	30	8	50	.
<i>Equisetum arvense</i>	8	.	3	.	38
<i>Artemisia campestris</i>	8	22	.	.	.
<i>Thymus pulegioides</i>	1	.	28	.	.	.
<i>Galium saxatile</i>	30	12	.	.
<i>Bromus benekenii</i>	.	.	18	22	4	1
<i>Nardus stricta</i>	24	.	.
<i>Lathyrus vernus</i>	.	2	9	22	4
<i>Seseli osseum</i>	28	.	.
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	.	.	.	22	8	1
<i>Maianthemum bifolium</i>	.	7	.	.	.	20

Tabulka 4

Tabulka 4 (pokračování ze strany 155)


Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Phalaris arundinacea</i>	.	2	5	.	25
<i>Geranium pratense</i>	5	.	25
Mechové patro															
Piceo abietis-Sorbetum aucupariae															
<i>Lophozia ventricosa</i>	30	.	.	—
<i>Scapania nemorea</i>	30	.	.	—
<i>Paraleucobryum longifolium</i>	13	40	.	.	—
<i>Diplophyllum albicans</i>	20	.	.	—
<i>Racomitrium sudeticum</i>	20	.	.	—	10	.
<i>Dicranum montanum</i>	20	.	.	—	1	.	.	10	.	.
<i>Plagiothecium curvifolium</i>	20	.	.	—
<i>Polytrichum formosum</i>	25	29	25	.	7	80	3	.	—	1	11	3	.	25	50
<i>Dicranum scoparium</i>	.	13	.	33	.	70	.	.	—	.	4	.	.	40	.
<i>Cephalozia bicuspidata</i>	20	.	.	—
Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo															
<i>Cetraria islandica</i>	—	45	.
<i>Dicranum fuscescens</i>	—	15	.
Ostatní druhy s vyšší frekvencí															
<i>Hypnum cupressiforme</i> s.l.	38	13	38	67	.	20	3	.	—	14	42	9	39	.	.
<i>Brachythecium rutabulum</i>	.	21	25	33	7	20	3	.	—	34	7	17	6	.	.
<i>Bryum capillare</i>	—	10	21	.	11	.	.
<i>Plagiornnium affine</i> s.l.	13	29	13	.	14	.	.	.	—	5	11	9	.	.	.
<i>Ceratodon purpureus</i>	.	.	25	.	14	.	3	.	—	2	11	.	17	.	.
<i>Pohlia nutans</i>	40	3	.	—	1	3	3	.	5	.
<i>Dicranella heteromalla</i>	.	4	13	.	.	30	3	.	—	.	4
<i>Plagiothecium laetum</i>	13	4	.	.	.	20	.	.	—	1	3	.	.	5	.
<i>Dicranodontium denudatum</i>	20	.	.	—	10	.


▷▷

Obr. 13. Srovnání asociací křovinné vegetace pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, nadmořských výšek a pokryvnosti stromového, keřového a bylinného patra. Obdélníky vyznačují interkvartilové rozpětí (rozsah mezi jejich horním a dolním okrajem obsahuje 25–75 % hodnot), vodorovná úsečka uvnitř obdélníků medián a svislé úsečky pod a nad obdélníky kvantily 5 a 95 % (rozpětí úseček obsahuje 90 % zaznamenaných hodnot). Vodorovná čára na pozadí grafů znázorňuje medián a barevný pás kolem ní interkvartilové rozpětí (25–75 % hodnot) dané proměnné pro všechny asociace lesní a křovinné vegetace České republiky.

Fig. 13. A comparison of associations of scrub vegetation by means of Ellenberg indicator values, altitude and covers of tree, shrub and herb layers. Boxes represent interquartile range (25–75% of observed values), horizontal line inside the boxes is the median and whiskers represent 5–95% of observed values for each association. Horizontal line in the background of the plots and the colour envelope around it represent the median and the range of 25–75% of values of all the associations of forest and scrub vegetation of the Czech Republic.

Obr. 13





Obr. 13

