
LBC01
Galio odorati-Fagetum
***sylvaticae* Sougnez**
et Thill 1959*
Mezotrofní bučiny

Tabulka 6, sloupec 5 (str. 237)

Nomen mutatum propositum et nomen conservandum
propositum (proti *Dentario bulbiferae-Fagetum*
Mikyška 1939 a *Festuco altissimae-Fagetum*
Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957; Willner
et al. 2011)

* Zpracoval R. Hédl

Orig. (Sougnez & Thill 1959): *Asperulo-Fagetum* (*Asperula odorata* = *Galium odoratum*, *Fagus sylvatica*)
 Syn.: *Dentario bulbiferae-Fagetum* Mikyška 1939 (potenciální správné jméno), *Dentario bulbiferae-Fagetum* Hartmann 1953 (§ 31, mladší homonymum, non: *Dentario bulbiferae-Fagetum* Mikyška 1939), *Festuco altissimae-Fagetum* Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957 (potenciální správné jméno), *Dentario enneaphylli-Fagetum* Oberdorfer ex W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 p. p., *Tilio cordatae-Fagetum* Mráz 1960 p. p., *Dentario glandulosae-Fagetum* W. Matuszkiewicz ex Guzikowa et Kornaš 1969 p. p.

Diagnostické druhy: *Fagus sylvatica*; *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Mycelis muralis*, *Viola reichenbachiana*

Konstantní druhy: ***Fagus sylvatica***; *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas*, ***Galium odoratum***, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*

Dominantní druhy: ***Fagus sylvatica***; *Galium odoratum*, *Melica uniflora*, *Oxalis acetosella*

Formální definice: *Fagus sylvatica* pokr. > 50 % AND skup. ***Galium odoratum*** NOT skup. ***Carex pilosa*** NOT skup. ***Cephalanthera damasonium*** NOT skup. ***Mercurialis perennis*** NOT *Carex pilosa* pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje vysokokmenné lesy s dominantním bukem lesním (*Fagus sylvatica*). Obvyklá pokryvnost stromového patra se pohybuje mezi 60 a 90 %. V závislosti na stanovišti a hospodářských vlivech jsou v různé míře přimíšeny habr obecný (*Carpinus betulus*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*), dub zimní (*Quercus petraea* agg.), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), smrk ztepilý (*Picea abies*) a méně často i další druhy stromů. V minulosti tvořila na různých stanovištích významnou příměs jedle bělokorá (*Abies alba*). Keřové patro představuje zejména zmlazení druhů stromového patra a ob-



Obr. 101. *Galio odorati-Fagetum sylvaticae*. Jarní aspekt bučiny s kyčelnicí cibulkonosnou (*Dentaria bulbifera*) na okraji Třeboňské pánve u Chlumu u Třeboně. (J. Navrátil 2010.)

Fig. 101. Spring in a beech forest with *Dentaria bulbifera* on the edge of the Třeboň basin near Chlum u Třeboně, Jindřichův Hradec district, southern Bohemia.


vykle má malou pokryvnost, případně i chybí. Bylinné patro je co do pokryvnosti i druhového složení velmi různorodé a téměř vždy obsahuje lesní druhy se širokou ekologickou amplitudou, např. *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Galium odoratum*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio nemorensis* agg. a *Viola reichenbachiana*. Často jsou zastoupeny některé trávy (např. *Brachypodium sylvaticum*, *Festuca altissima* a *Melica nutans*) a v karpatské části Moravy i ostřice chlupatá (*Carex pilosa*). Na úživnějších stanovištích mohou převládnout druhy náročné na vlhkost a živiny (např. *Carex sylvatica*, *Galeobdolon luteum* agg., *Hordelymus europaeus*, *Impatiens noli-tangere*, *I. parviflora*, *Mercurialis perennis* a *Milium effusum*), naopak na živinami chudších stanovištích jsou hojně lesní acidotolerantní druhy (např. *Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *D. dilatata*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides* a *Maianthemum bifolium*). Na živinami bohatých půdách bývá vyvinut jarní aspekt, ve kterém se uplatňují geofyty (např. *Anemone nemorosa*, *Dentaria bulbifera* a *D. enneaphyllos*). V porostech se obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m². Mechové patro bývá jen slabě vyvinuto.

Stanoviště. Asociace se vyskytuje na většině geologických substrátů od nížin až po vyšší horské polohy, nejhojněji však v rozpětí nadmořských výšek 400–800 m, a to na plošinách i mírných nebo příkrých svazích všech orientací. Půdy jsou nejčastěji kambizemě s moderovým humusem, v nižších polohách illimerizované půdy (hnědozemě a luvizemě), ve větších nadmořských výškách pak půdy podzolované (avšak ne přímo podzoly), v okolí vodotečí nebo prameniští oglejené. Jejich reakce je mírně kyselá až neutrální. Svrchní půdní horizonty, určující rozvoj bylinného patra, jsou středně bohaté živinami. Vodní režim je vyrovnaný: půdy nejsou ani příliš vysychavé, ani zamokřené.

Dynamika a management. Původ asociace je třeba hledat ve společném působení přírodních faktorů a hospodářských vlivů. Mezotrofní bučiny ve střední Evropě vznikaly od středního holocénu, avšak jejich dnešní podoba je dána zpravidla stovky let trvajícím intenzivním vlivem člověka. Dnes jsou to převážně hospodářské lesy, jejichž dynamiku mimo nahodilé vlivy, jako jsou polomy,

určuje hlavně hospodářský režim. Obvyklá doba obmýtí je v současnosti 80 až 120 let. V rezervacích postupně nabývají na významu přírodní procesy cyklické sukcese temperátního lesa (K. Král et al. 2010). Historicky se na dynamice mezotrofních bučin podílely i nelesnické formy hospodaření, např. extenzivní pastva dobytka a prasat (v semenných letech na bukvicích). Nejdéle přetrvaly tyto praktiky v karpatské části Moravy. Od holosečných způsobů těžby se dnes pozvolna přechází k metodám přírodě blízkého hospodaření (Košulič 2010). Tyto metody a následná postupná dominance buku v původně smíšených porostech ovšem způsobují omezený přístup světla do podrostu a kumulaci listového opadu, což může mít v relativně krátké době za následek omezení diverzity bylin (Lysík 2009).

Rozšíření. Mezotrofní bučiny asociace *Galio-Fagetum* se vyskytují především v pahorkatinách a hornatinách střední Evropy (Müller in Oberdorfer 1992: 193–249, Moravec in Moravec et al. 2000: 143–169, Bohn et al. 2000–2003, J. M. Matuszkiewicz 2001, Willner 2002, Willner in Willner & Grabherr 2007: 144–166, Trinajstić 2008). Podobná společenstva jsou známa z Francie (Bardat et al. 2004) a Švýcarska (Keller et al. 1998), zasahují však až na Pyrenejský poloostrov (Rivas-Martínez et al. 2001), na jihovýchod Velké Británie (Rodwell 1991), do jižní Skandinávie (Dierßen 1996) a směrem k jihovýchodu přes Bulharsko zřejmě až do Řecka (Tzonev et al. 2006). Najdeme je téměř po celém území České republiky, nejhojněji v podhorských a horských oblastech Českého masivu a Karpat. V nížinách Čech i Moravy jsou mezotrofní bučiny velmi vzácné. Četnější fytocenologické snímky jsou k dispozici například z Krušných hor (Moravec 1974, 1979), Křivoklátska (Moravec 1977, Nesvadbová & Sofron 1978, Moravec in Kolbek et al. 2003a: 171–181), Ještědského hřbetu (Sýkora 1967a), Rychlebských hor (Hédl, nepubl.), Hrubého Jeseníku (J. Šmarda 1950, Hartmann & Jahn 1967, Hédl nepubl.), Chřibů (Havlová 2000), Bílých Karpat (J. Němec 2000), Hostýnských vrchů (Kuželová 1999) a Moravskoslezských Beskyd (Holuša, Satora, Togner, vše nepubl.). Vyskytují se však i v Českém středohoří (Zlatník 1928c, Klika 1952, Kolbek 1969) a Českém krasu (Samek 1964, Kubíková 2007). Ve velkých oblastech Českého masivu, jako je Českomoravská vrchovina a západní části Čech, se tato asociace vyskytuje po-



Obr. 102. Rozšíření asociace LBC01 *Galio odorati-Fagetum sylvaticae*.

Fig. 102. Distribution of the association LBC01 *Galio odorati-Fagetum sylvaticae*.

měrně vzácně (např. K. Mráz 1965, Moravec 1979, Sofron 1990), její potenciální rozšíření je však v těchto územích poměrně rozsáhlé (Neuhäuslová et al. 1998).

Variabilita. Variabilita mezotrofních bučin asociace *Galio-Fagetum* je značná a odráží rozdíly v nadmořské výšce, vlastnostech substrátu, převládnutí určitého druhu bylinného patra nebo areály některých druhů. Většina zde rozlišených variant odpovídá dříve rozlišovaným samostatným asociacím (Moravec in Moravec et al. 1982: 187–239, Moravec in Moravec et al. 2000: 143–169).

Varianta *Lathyrus vernus* (LBC01a) zahrnuje mezotrofní bučiny teplých území, zejména Křivoklátska a dolního Povltaví. Další výskyty byly zaznamenány v Branžovském hvozdu, na Ještědském hřebetu, v Českém středohoří, středním Polabí, Moravském krasu a v severní části Rychlebských hor. Tyto druhově bohaté květnaté bučiny se vyznačují přítomností druhů teplomilných mezotrofních lesů, např. *Bromus benekenii*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Lilium martagon* a *Veronica chamaedrys*. Varianta zčásti odpovídá asociaci *Tilio cordatae-Fagetum* Mráz 1960 (Moravec in Moravec et al. 2000: 143–169) a tvoří přechod k asociaci *Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae*.

Varianta *Vaccinium myrtillus* (LBC01b) zahrnuje druhově chudší porosty mezotrofních bučin

na přechodu k acidofilním bučinám. Vyskytuje se na kyselých substrátech od kolinního po montánní stupeň v nadmořských výškách 300–900 m. Četnější výskyt je doložen v Hradčanských stěnách, dolním Posázaví, Rychlebských horách a Hrubém Jeseníku. Variantu charakterizují druhy *Vaccinium myrtillus* a *Veronica officinalis*, v nižších polohách dále *Festuca ovina* a *Hieracium sabaudum* s. l. Významně se uplatňují mechy *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l. a *Polytrichum formosum*.

Varianta *Carex pilosa* (LBC01c) zahrnuje bučiny převážně submontánního stupně ve Ždánickém lese, Chříbech a Bílých Karpatech v nadmořských výškách 350–500 m. Zaznamenána byla také v Moravském krasu, na Drahanské vrchovině, Třeboňsku, ve středním Podolí a Rychlebských horách. Význačná je dominance ostrice chlupaté (*Carex pilosa*) a hojný výskyt druhů *Cephalanthera longifolia* a *Circaea lutetiana*. Bučiny s dominantní ostricí chlupatou a výskytem druhů *Galium intermedium*, *Euphorbia amygdaloides* nebo *Hacquetia epipactis* však hodnotíme jako samostatnou asociaci *Carici pilosae-Fagetum sylvaticae*.

Varianta *Dentaria enneaphyllos* (LBC01d) zahrnuje podhorské až horské mezotrofní bučiny rozšířené v Českém masivu i Karpatech. Nacházejí se v nadmořských výškách 400–1000 m například na Šumavě, v Krušných horách, ve všech sudetských pohořích, Moravském krasu, Chříbech a Moravsko-

slezských Beskydech. Charakterizují je druhy náročné na kvalitu humusu, např. *Dentaria bulbifera*, *D. enneaphylos*, *Galeobdolon luteum* agg. a *Impatiens noli-tangere*. Ve stromovém patře se významněji uplatňuje jedle bělokora (*Abies alba*). V karpatské oblasti jsou na tyto bučiny vázány druhy *Dentaria glandulosa*, *Euphorbia amygdaloides*, *Polystichum braunii* a *Salvia glutinosa*. Od ostatních bučin zahrnutých do asociace *Galio-Fagetum* se slabě odlišují výskytem druhů vlhkých, živinami bohatých půd, např. *Cicerbita alpina*, *Petasites albus* a *Stellaria nemorum*. Variantu lze částečně ztotožnit s dřívě rozlišovanými asociacemi *Dentario enneaphylli-Fagetum* a *Dentario glandulosae-Fagetum* (Moravec in Moravec et al. 2000: 143–169). V přijaté klasifikaci jde o přechodné porosty k asociaci *Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae*.

Varianta *Festuca altissima* (LBC01e) sdružuje podhorské a horské bučiny mírně kyselých a vodou dobře zásobených půd. Humusovou formou je moder až morový moder. Tyto bučiny se vyskytují převážně v sudetských pohořích, přičemž velká část fytocenologických snímků pochází z Rychlebských hor. Typická je dominance kostřavy lesní (*Festuca altissima*) a častý výskyt, někdy i kodominance třtiny chloupkaté (*Calamagrostis villosa*) a kapradě osténkaté (*Dryopteris carthusiana*). Ve stromovém patře bývá významná příměs smrku ztepilého (*Picea abies*) a javoru kleny (*Acer pseudoplatanus*). V bylinném patře se dále významně uplatňují některé acidofyty (např. *Avenella flexuosa* a *Luzula luzuloides*) a druhy svěžích humózních půd (např. *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galeopsis pubescens* a *Stachys sylvatica*, v jarním aspektu *Leucojum vernum*). Varianta odpovídá druhově bohatším porostům asociace *Festuco altissimae-Fagetum* Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957.

Hospodářský význam a ohrožení. Mezotrofní bučiny této asociace představují nejen jeden z hlavních zdrojů bukového dřeva, ale poskytují také dřevo dalších listnáčů (javor, lípa, jilm aj.). V minulosti byly také jedním z hlavních zdrojů jedlového dřeva, které bylo důležitým a místy převažujícím stavebním materiálem (Opravitel 1976). Zachované bučiny jsou ohroženy převodem na kultury smrku a vysokými stavy spárkaté zvěře, která významně omezuje přirozenou obnovu. Zvěř tak dlouhodobě udržuje lesy většinou bez přirozeně odrůstajících dřevin, což může mít naopak i pozitivní vliv na by-

linné patro, které by jinak skomíralo pod zástínem bukového zmlazení. Zarůstání světlých stanovišť v lese je širší ochranný problém (např. Peterken & Francis 1999, Van Calster et al. 2008), který lze vztáhnout i na mezotrofní bučiny. Dalším významným ohrožením diversity bylinného patra jsou dusíkaté depozice (Thimonier et al. 1992, Verheyen et al. 2012). Rostlinné invaze jsou u těchto společenstev zatím poměrně omezené (Chytrý et al. 2009), v budoucnosti by se však mohl ještě výrazněji rozšířit dnes již běžný druh *Impatiens parviflora* (Goddefroid & Koedam 2010).

Nomenklatorická poznámka. Willner et al. (2011) navrhli konzervaci jména *Asperulo-Fagetum* Sougnez et Thill 1959 proti starším platným jménům *Dentario bulbiferae-Fagetum* Hartmann 1953 a *Festuco altissimae-Fagetum* Schlüter 1957. Konzervace proti prvnímu z těchto jmen však nebyla nutná, protože jde o mladší homonymum jména *Dentario bulbiferae-Fagetum* Mikyška 1939 pro asociaci popsanou ze středního Slovenska (Mikyška 1939). V duchu návrhu, který předložili Willner et al. (2011) doplňujeme návrh na konzervaci jména *Asperulo-Fagetum* Sougnez et Thill 1959 proti jménu *Dentario bulbiferae-Fagetum* Mikyška 1939.

■ **Summary.** The association *Galio-Fagetum* includes mesic forests dominated by *Fagus sylvatica*, which occur on cambisols over various types of bedrock. Their herb layer includes particularly forest generalists, but also some nutrient-demanding species of wet soils, as well as acidophytes, depending on local soil conditions. They are common across the Czech Republic in submontane and montane areas.

Tabulka 6. Synoptická tabulka asociací mezofilních opadavých listnatých lesů (třída *Carpino-Fagetea*, část 2: *Carpinion betuli*, *Fagion sylvaticae*, *Sorbo-Fagion sylvaticae*, *Luzulo-Fagion sylvaticae* a *Tilio platyphylli-Acerion*).

Table 6. Synoptic table of the associations of mesic deciduous broad-leaved forests (class *Carpino-Fagetea*, part 2: *Carpinion betuli*, *Fagion sylvaticae*, *Sorbo-Fagion sylvaticae*, *Luzulo-Fagion sylvaticae* and *Tilio platyphylli-Acerion*).

- 1 – LBB01. *Galio sylvatici-Carpinetum betuli*
 2 – LBB02. *Stellario holosteeae-Carpinetum betuli*
 3 – LBB03. *Carici pilosae-Carpinetum betuli*
 4 – LBB04. *Primulo veris-Carpinetum betuli*
 5 – LBC01. *Galio odorati-Fagetum sylvaticae*
 6 – LBC02. *Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae*
 7 – LBC03. *Carici pilosae-Fagetum sylvaticae*
 8 – LBC04. *Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae*
 9 – LBC05. *Galio rotundifolii-Abietetum albae*
 10 – LBD01. *Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae*
 11 – LBE01. *Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae*
 12 – LBE02. *Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae*
 13 – LBE03. *Luzulo-Abietetum albae*
 14 – LBE04. *Vaccinio myrtilli-Abietetum albae*
 15 – LBF01. *Aceri-Tilietum*
 16 – LBF02. *Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris*
 17 – LBF03. *Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani*
 18 – LBF04. *Seslerio albicantis-Tilietum cordatae*

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Počet snímků	319	52	236	22	305	515	80	8	127	39	286	24	107	36	243	165	123	15
Počet snímků s údaji																		
o mechovém patře	183	30	172	18	206	378	61	8	117	21	234	16	105	33	145	101	79	12

Stromové a keřové patro

Primulo veris-Carpinetum betuli

<i>Cornus mas</i>	2	.	5	86	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.	20
<i>Euonymus verrucosus</i>	3	4	3	64	.	1	.	.	.	3	.	.	.	.	8	1	1	13
<i>Ligustrum vulgare</i>	7	4	8	82	.	.	1	.	.	5	1	.	.	.	2	.	.	7
<i>Acer campestre</i>	25	37	22	82	1	1	6	.	.	.	1	.	.	.	15	5	2	7
<i>Crataegus monogyna</i> s. l.	8	10	11	64	.	.	1	.	.	5	.	.	.	.	6	2	.	.
<i>Rhamnus cathartica</i>	3	6	2	36	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.
<i>Quercus pubescens</i> agg.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lonicera caprifolium</i>	1	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Staphylea pinnata</i>	1	2	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.
<i>Crataegus laevigata</i>	14	27	14	36	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	5	3	.	.
<i>Cornus sanguinea</i>	20	31	15	45	1	1	3	.	2	23	.	.	.	.	13	4	2	27
<i>Pyrus pyrastrer</i>	1	.	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.

Galio rotundifolii-Abietetum albae

<i>Rubus idaeus</i>	7	23	6	.	24	36	16	75	86	8	23	54	71	19	19	27	38	7
---------------------	---	----	---	---	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	---

Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris

<i>Fraxinus excelsior</i>	11	33	20	41	4	14	5	13	12	21	1	.	1	.	53	64	46	20
---------------------------	----	----	----	----	---	----	---	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	----

Tabulka 6 (pokračování ze strany 237)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Diagnostické druhy pro dvě a více asociací																		
<i>Carpinus betulus</i>	77	87	87	86	11	10	26	.	17	28	4	.	7	.	62	13	17	60
<i>Quercus petraea</i> agg.	72	35	61	95	12	4	39	.	6	15	7	.	7	17	21	3	2	60
<i>Daphne mezereum</i>	10	25	38	5	6	18	28	25	9	38	1	.	.	.	16	9	14	.
<i>Tilia cordata</i>	29	46	59	36	6	10	10	.	10	13	1	.	5	3	51	22	17	47
<i>Sorbus torminalis</i>	11	4	6	64	1	1	.	.	1	15	1	.	.	.	3	1	.	40
<i>Corylus avellana</i>	33	37	25	68	2	3	5	.	35	18	2	.	29	3	42	22	22	53
<i>Fagus sylvatica</i>	14	25	37	5	100	100	100	100	30	100	100	100	25	36	24	58	66	33
<i>Sorbus aucuparia</i>	8	12	8	.	7	9	1	63	31	13	15	21	46	31	18	20	15	13
<i>Acer pseudoplatanus</i>	8	23	26	5	23	46	15	100	22	13	19	21	8	.	63	88	87	7
<i>Picea abies</i>	8	19	11	.	26	35	10	100	57	21	55	79	83	100	15	32	26	13
<i>Abies alba</i>	8	19	4	.	15	22	8	13	100	10	16	4	100	100	15	16	27	7
<i>Viscum album</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	23	.	1	.	21	17	1	.	.	.
<i>Lonicera xylosteum</i>	11	23	11	14	1	3	4	.	24	15	.	.	3	.	30	8	9	13
<i>Acer platanoides</i>	4	13	8	23	4	11	3	.	5	23	1	.	.	.	44	45	33	27
<i>Ulmus glabra</i>	2	10	3	.	3	10	6	13	6	3	1	.	.	.	35	52	46	.
<i>Tilia platyphyllos</i>	4	19	7	5	1	5	1	.	3	8	.	.	.	.	42	18	22	67
<i>Sorbus aria</i> agg.	3	.	.	.	.	1	.	.	1	8	.	.	.	.	3	.	.	47
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	3	.	.	9	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	1	.	.	47
<i>Taxus baccata</i>	1	4	.	.	.	1	.	.	1	5	.	.	.	.	3	1	.	13

Ostatní druhy s vyšší frekvencí

<i>Rubus fruticosus</i> agg.	19	19	26	9	33	31	53	.	39	3	15	8	49	11	9	19	17	.
<i>Quercus robur</i>	27	40	31	23	3	2	1	.	3	3	5	.	8	3	22	8	4	.
<i>Sambucus nigra</i>	4	13	6	5	3	5	3	.	19	3	1	.	9	.	20	18	24	.
<i>Betula pendula</i>	13	8	27	.	3	2	1	.	4	.	8	8	13	8	9	5	2	7
<i>Sambucus racemosa</i>	1	10	.	.	2	6	1	.	27	.	1	.	22	3	11	15	20	.
<i>Ribes uva-crispa</i>	4	13	2	.	1	4	.	.	10	5	.	.	2	.	23	13	11	.
<i>Pinus sylvestris</i>	11	12	2	.	1	1	.	.	17	21	8	.	24	25	2	1	.	13

Bylinné patro***Carici pilosae-Carpinetum betuli***

<i>Symphytum tuberosum</i>	9	8	39	.	2	4	14	.	6	.	.	.	.	.	8	2	3	.
<i>Sanicula europaea</i>	22	19	35	18	14	24	30	13	22	23	1	.	.	.	8	7	3	.

Primulo veris-Carpinetum betuli

<i>Melittis melissophyllum</i>	18	2	19	95	1	1	9	.	.	8	.	.	.	.	4	1	.	7
<i>Buglossoides purpureoacerulea</i>	1	.	.	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Viola mirabilis</i>	9	10	6	68	1	1	1	.	.	8	.	.	.	.	9	1	2	.
<i>Clinopodium vulgare</i>	18	12	10	73	1	1	.	.	2	3	.	.	.	.	7	1	.	13
<i>Vicia pisiformis</i>	3	2	2	27	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Dictamnus albus</i>	2	.	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Hypericum montanum</i>	3	2	4	32	1	1	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	.	.
<i>Hieracium sabaudum</i> s. l.	37	8	30	64	3	1	5	.	4	15	6	.	4	.	4	1	.	13
<i>Carex michelii</i>	2	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Campanula rapunculoides</i>	30	29	20	68	3	3	9	.	12	49	.	.	3	.	23	5	4	27
<i>Carex muricata</i> agg.	12	2	5	45	4	6	3	13	13	15	1	.	2	.	7	2	2	7
<i>Bromus benekenii</i>	12	23	19	36	8	11	9	.	10	28	.	.	.	.	19	7	4	7
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	16	8	5	41	1	1	.	.	4	5	.	.	.	.	5	.	.	7

Tabulka 6 (pokračování ze strany 238)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Lactuca quercina</i>	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Platanthera bifolia</i>	9	.	9	23	1	1	4	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.
<i>Mercurialis perennis</i>-Fagetum sylvaticae																		
<i>Dentaria enneaphyllos</i>	1	2	1	.	13	27	6	.	1	15	1	.	.	.	7	19	16	.
<i>Hordelymus europaeus</i>	1	8	6	5	13	26	23	.	4	13	1	.	1	.	4	10	7	7
<i>Carici pilosae</i>-Fagetum sylvaticae																		
<i>Cephalanthera longifolia</i>	1	2	8	5	3	1	14	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Athyrio distentifolii</i>-Fagetum sylvaticae																		
<i>Veratrum album</i> subsp. <i>lobelianum</i>	.	.	1	.	.	1	.	100	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
<i>Athyrium distentifolium</i>	.	.	.	.	1	1	.	75	.	.	1	17	.	.	.	.	.	.
<i>Rumex arifolius</i>	.	.	.	.	1	1	.	75	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cicerbita alpina</i>	.	.	.	.	1	2	.	50	.	.	2	13	1	.	.	.	.	.
<i>Stellaria nemorum</i>	1	4	1	.	6	13	3	100	6	.	6	17	6	.	3	13	24	.
<i>Streptopus amplexifolius</i>	.	.	.	.	.	1	.	38	.	.	1	13	.	.	.	.	2	.
<i>Adenostyles alliariae</i>	.	.	.	.	.	1	.	38	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	.	.	.	.	.	1	.	38	.	.	.	.	.	.	.	1	7	.
<i>Paris quadrifolia</i>	4	21	18	.	10	30	10	63	17	3	3	4	6	.	14	10	21	.
<i>Milium effusum</i>	15	23	28	14	15	33	11	75	24	.	7	8	12	.	20	25	31	.
<i>Circaea alpina</i>	.	.	.	.	3	7	.	38	6	.	1	.	5	.	1	4	4	.
<i>Lysimachia nemorum</i>	.	.	1	.	12	13	1	50	3	.	5	8	1	.	.	4	6	.
<i>Aconitum plicatum</i>	.	.	.	.	.	1	.	25	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Ranunculus platanifolius</i>	.	.	.	.	.	1	.	25	.	.	2	8	.	.	.	.	4	.
<i>Solidago virgaurea</i>	8	4	11	23	10	7	6	50	23	18	13	21	32	8	7	2	7	20
<i>Festuca altissima</i>	1	6	2	.	24	27	3	38	20	10	10	4	18	.	6	16	21	.
<i>Anemone nemorosa</i>	43	42	22	23	15	19	9	63	8	18	6	4	6	.	19	17	15	.
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	.	8	1	.	2	4	.	38	3	.	1	.	3	.	5	6	18	.
<i>Gallio rotundifolii</i>-Abietetum albae																		
<i>Moehringia trinervia</i>	19	27	11	9	21	28	13	13	63	5	5	4	37	6	26	21	12	7
<i>Galium rotundifolium</i>	4	4	1	.	7	5	.	.	27	8	3	.	13	6	1	1	.	.
<i>Cephalanthero damasonii</i>-Fagetum sylvaticae																		
<i>Cephalanthera damasonium</i>	3	.	3	5	2	1	1	.	.	62	.	.	.	.	2	1	.	.
<i>Epipactis helleborine</i> agg.	3	2	7	9	2	3	9	.	6	56	.	.	1	.	4	1	.	7
<i>Cephalanthera rubra</i>	1	.	1	.	.	1	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Viola collina</i>	1	2	.	9	1	.	.	.	4	31	.	.	.	.	1	.	.	13
<i>Corallorhiza trifida</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Orthilia secunda</i>	1	.	1	.	1	.	.	.	2	18	1	.	.	.	.	.	.	.
<i>Hedera helix</i>	7	12	24	18	3	4	18	.	2	31	1	.	1	.	16	3	6	.
<i>Arabis hirsuta</i> agg.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	13
<i>Calamagrostio villosae</i>-Fagetum sylvaticae																		
<i>Blechnum spicant</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	21	2	.	.	.	.	.
<i>Luzulo-Abietetum albae</i>																		
<i>Luzula pilosa</i>	12	2	13	.	8	5	1	.	32	.	11	13	48	22	4	1	3	.
<i>Dryopteris carthusiana</i>	1	2	4	.	16	26	6	25	46	.	14	4	55	33	3	12	20	.

Tabulka 6 (pokračování ze strany 239)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Vaccinio myrtilli-Abietetum albae</i>																		
<i>Avenella flexuosa</i>	14	2	.	5	14	6	.	13	36	21	74	71	71	89	5	2	3	13
<i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>																		
<i>Geranium robertianum</i>	18	37	17	9	10	51	24	13	53	18	1	.	11	3	66	70	57	13
<i>Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani</i>																		
<i>Lunaria rediviva</i>	.	.	1	.	1	3	.	13	1	.	1	.	.	.	3	7	75	.
<i>Aruncus dioicus</i>	1	2	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	2	2	37	.
<i>Polystichum aculeatum</i>	.	.	1	.	3	9	1	13	.	.	1	.	.	.	3	7	18	.
<i>Seslerio albicantis-Tilietum cordatae</i>																		
<i>Anthericum ramosum</i>	1	.	1	18	.	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	80
<i>Asplenium trichomanes</i>	1	.	1	5	1	2	.	.	4	23	.	.	1	.	12	3	7	53
<i>Vincetoxicum hirsutaria</i>	7	4	4	18	.	1	.	.	2	31	1	.	.	.	7	1	.	67
<i>Fourraea alpina</i>	1	.	.	9	.	1	.	.	.	8	.	.	.	.	1	.	.	20
<i>Bupleurum falcatum</i>	2	.	1	23	.	.	.	.	1	8	.	.	.	.	1	.	.	60
<i>Arabidopsis arenosa</i>	4	.	.	.	1	1	.	.	6	26	.	.	3	.	6	1	1	40
<i>Primula veris</i>	14	13	5	32	1	2	4	.	.	5	.	.	.	.	5	1	.	47
<i>Melica ciliata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Clematis recta</i>	2	.	1	5	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Silene nemoralis</i>	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	13
<i>Lathyrus pannonicus</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
<i>Laserpitium latifolium</i>	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	13
<i>Polygonatum odoratum</i>	12	8	9	18	1	1	3	.	5	31	.	.	1	.	4	1	2	40
<i>Arenaria grandiflora</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
<i>Nocca montana</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	13
<i>Cyclamen purpurascens</i>	3	2	2	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	13
<i>Origanum vulgare</i>	1	.	.	9	.	.	.	.	1	8	.	.	.	.	1	1	.	33
Diagnostické druhy pro dvě a více asociací																		
<i>Stellaria holostea</i>	56	62	28	36	5	8	4	.	5	8	1	.	1	3	47	12	14	20
<i>Convallaria majalis</i>	50	27	47	86	2	4	9	13	9	33	5	.	6	6	20	4	2	27
<i>Lathyrus niger</i>	38	6	29	86	1	1	5	.	2	10	1	.	.	.	2	.	.	.
<i>Poa nemoralis</i>	90	85	64	86	44	46	34	.	42	59	19	.	15	6	73	45	33	47
<i>Festuca heterophylla</i>	25	2	16	45	2	1	1	.	1	5	1	.	.	.	3	.	.	7
<i>Tanacetum corymbosum</i>	44	13	6	77	1	1	1	.	2	26	.	.	.	.	10	1	.	60
<i>Galium sylvaticum</i>	66	67	28	95	5	4	5	.	21	36	1	.	5	.	47	4	11	33
<i>Hepatica nobilis</i>	64	63	18	32	8	11	4	.	24	51	.	.	.	.	55	4	14	47
<i>Lathyrus vernus</i>	77	79	73	82	17	20	61	.	23	59	2	.	.	.	53	10	18	40
<i>Melica nutans</i>	71	77	58	91	14	20	29	.	61	44	1	.	20	3	58	17	18	40
<i>Campanula trachelium</i>	35	46	47	50	4	7	16	.	16	21	1	.	1	.	45	12	15	20
<i>Pulmonaria officinalis</i> agg.	55	73	76	95	10	27	53	25	31	15	1	4	3	.	60	36	40	7
<i>Asarum europaeum</i>	30	56	53	73	8	22	38	13	39	8	1	.	2	3	44	36	41	.
<i>Melica uniflora</i>	15	6	39	73	21	19	58	.	8	15	2	.	3	.	9	16	10	.
<i>Neottia nidus-avis</i>	15	2	27	27	2	5	10	.	.	31	.	.	1	.	6	.	.	.
<i>Carex pilosa</i>	12	12	90	23	17	3	95	.	1	8	1	.	.	.	3	1	.	.
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	2	2	69	5	9	11	89	.	2	8	.	.	.	.	5	6	6	.
<i>Galium intermedium</i>	1	.	53	.	1	1	26	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
<i>Hacquetia epipactis</i>	1	2	36	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.

Tabulka 6 (pokračování ze strany 240)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Polygonatum multiflorum</i>	34	42	61	64	7	12	38	.	9	10	1	.	5	.	30	13	14	.
<i>Dactylis polygama</i>	26	25	43	55	2	1	16	.	.	13	.	.	.	.	10	5	.	27
<i>Galium odoratum</i>	41	62	76	45	86	90	88	38	47	64	6	8	1	.	51	61	61	7
<i>Viola reichenbachiana</i>	40	54	76	23	64	65	83	13	54	33	4	.	4	3	39	27	20	7
<i>Maianthemum bifolium</i>	34	38	61	.	29	25	49	50	38	13	33	71	45	39	21	12	9	.
<i>Carex digitata</i>	34	12	53	64	10	6	25	.	41	72	1	.	13	6	17	1	4	60
<i>Hieracium murorum</i>	63	33	45	68	36	25	33	.	57	82	42	25	68	39	23	5	7	87
<i>Campanula persicifolia</i>	44	21	23	77	4	2	5	.	22	38	1	.	2	.	16	1	1	80
<i>Carex montana</i>	23	.	14	50	1	1	.	.	1	10	1	.	.	.	2	.	.	33
<i>Dentaria bulbifera</i>	11	17	25	18	42	49	50	.	10	15	1	.	.	.	10	24	24	.
<i>Mycelis muralis</i>	34	50	37	9	67	58	58	13	82	46	9	4	42	11	40	24	24	7
<i>Actaea spicata</i>	7	23	14	.	3	48	18	38	42	38	1	.	4	.	35	38	33	.
<i>Oxalis acetosella</i>	14	44	32	.	72	84	49	100	91	3	53	92	98	47	37	53	68	.
<i>Galeobdolon luteum</i> agg.	26	48	43	9	31	85	28	75	44	18	12	8	9	.	75	82	80	7
<i>Dryopteris filix-mas</i>	13	31	20	.	50	70	33	63	86	10	22	17	60	.	52	72	85	.
<i>Mercurialis perennis</i>	26	54	32	18	19	88	30	38	50	74	2	.	1	.	67	81	76	20
<i>Senecio nemorensis</i> agg.	19	33	19	.	58	72	31	100	95	26	32	50	79	8	40	49	68	7
<i>Polygonatum verticillatum</i>	1	6	.	.	12	22	5	88	9	3	17	63	5	.	4	8	14	.
<i>Prenanthes purpurea</i>	5	6	3	.	33	40	10	100	34	15	40	75	37	14	9	15	35	.
<i>Phegopteris connectilis</i>	.	.	.	.	5	6	.	50	2	.	9	50	6	.	.	3	9	.
<i>Calamagrostis villosa</i>	.	.	.	.	8	7	.	75	3	.	24	100	20	25	1	3	2	.
<i>Homogyne alpina</i>	.	.	.	.	1	1	.	38	1	.	2	92	1	.	1	1	.	.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	1	.	.	.	19	20	.	38	18	.	23	42	21	.	3	9	11	.
<i>Athyrium filix-femina</i>	4	8	19	.	54	57	41	75	54	.	34	42	69	3	9	34	54	.
<i>Sesleria caerulea</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	1	33	.	.	.	.	1	1	.	100
<i>Dryopteris dilatata</i>	.	2	1	.	27	30	11	50	52	.	45	83	79	50	3	22	23	.
<i>Vaccinium myrtillus</i>	8	.	3	.	12	6	1	63	25	10	73	79	84	94	2	4	2	.

Ostatní druhy s vyšší frekvencí

<i>Urtica dioica</i>	5	54	7	.	21	44	11	25	50	5	1	8	13	.	48	70	72	.
<i>Luzula luzuloides</i>	35	15	26	9	39	19	28	.	43	23	48	33	62	33	13	4	10	20
<i>Impatiens noli-tangere</i>	4	19	14	.	21	37	20	13	46	.	1	.	20	.	27	51	61	.
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	33	13	13	36	21	21	4	25	33	10	31	38	44	31	17	10	15	7
<i>Fragaria vesca</i>	47	29	43	59	10	12	14	.	52	31	1	4	28	6	16	10	7	27
<i>Scrophularia nodosa</i>	24	31	31	23	22	28	29	13	27	10	3	.	7	3	18	13	7	.
<i>Ajuga reptans</i>	23	25	57	.	13	16	38	38	21	21	3	.	7	.	14	7	7	.
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	24	42	47	50	16	12	31	.	16	13	1	.	3	.	23	14	7	.
<i>Carex sylvatica</i>	5	33	31	.	28	36	39	13	9	5	1	.	1	3	7	5	8	.
<i>Aegopodium podagraria</i>	17	77	41	9	3	8	11	25	6	10	.	.	2	.	48	27	20	.
<i>Veronica chamaedrys</i> agg.	48	23	32	55	8	8	6	.	13	10	1	.	2	.	18	7	3	47
<i>Geum urbanum</i>	29	58	28	50	2	3	9	.	9	5	.	.	1	3	45	15	11	7
<i>Impatiens parviflora</i>	18	29	11	.	14	8	15	.	14	3	1	.	16	6	39	19	13	7
<i>Epilobium montanum</i>	14	13	14	.	9	17	9	13	34	26	2	4	5	3	23	13	23	13
<i>Stachys sylvatica</i>	2	33	14	.	8	25	13	13	9	.	1	.	.	.	12	18	16	.
<i>Veronica officinalis</i>	21	4	14	32	13	6	13	.	29	15	12	4	24	6	2	4	2	.
<i>Viola riviniana</i>	31	15	20	14	7	5	5	.	30	8	2	.	19	3	12	2	1	.
<i>Alliaria petiolata</i>	14	33	10	23	6	8	15	.	6	10	1	.	.	.	41	8	12	.
<i>Lilium martagon</i>	13	25	25	5	3	6	10	25	2	21	1	.	.	.	22	6	9	20
<i>Hieracium lachenalii</i>	28	2	13	32	3	2	4	.	12	13	10	.	19	6	7	1	5	.
<i>Fragaria moschata</i>	24	29	21	36	2	2	8	.	3	18	.	.	.	.	16	3	2	33

Tabulka 6 (pokračování ze strany 241)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Circaea lutetiana</i>	1	17	19	.	10	14	35	.	8	.	.	.	.	.	5	5	14	.
<i>Petasites albus</i>	.	2	3	.	7	17	3	13	18	10	1	13	11	.	3	10	30	.
<i>Galeopsis tetrahit</i> agg.	11	8	3	5	6	14	1	.	20	.	3	.	20	3	7	3	3	.
<i>Euphorbia dulcis</i>	7	23	17	.	1	8	6	.	4	3	1	.	.	.	19	16	14	.
<i>Galium aparine</i>	13	25	3	18	2	2	3	.	9	5	.	.	6	.	28	12	8	.
<i>Myosotis sylvatica</i>	14	6	6	.	2	8	1	13	24	10	.	.	7	.	11	7	6	7
<i>Lamium maculatum</i>	4	38	1	.	2	3	.	.	3	.	.	.	.	.	34	15	15	.
<i>Veronica montana</i>	.	.	3	.	9	23	9	.	1	.	1	.	.	.	1	5	11	.
<i>Cardamine impatiens</i>	5	10	2	.	4	8	3	13	21	5	.	.	5	.	16	8	11	.
<i>Heracleum sphondylium</i>	11	21	17	5	1	3	5	13	3	8	.	.	1	.	14	6	11	.
<i>Primula elatior</i>	3	19	23	.	2	5	15	13	2	.	.	.	.	.	11	10	9	.
<i>Melampyrum pratense</i>	33	6	9	14	1	1	1	.	6	5	2	.	10	11	2	.	.	7
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	3	29	14	.	2	5	3	13	3	.	.	.	1	.	15	8	13	.
<i>Carex pilulifera</i>	1	.	1	.	3	2	.	.	12	.	22	4	33	25	.	2	.	.
<i>Melampyrum nemorosum</i>	18	19	15	23	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	6	.	.	20
<i>Glechoma hederacea</i> agg.	2	6	12	23	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	10	8	7	.
<i>Festuca ovina</i>	22	2	3	9	1	1	.	.	2	8	2	.	4	3	2	1	.	40
<i>Dactylis glomerata</i>	10	17	3	36	1	2	1	.	8	.	1	.	4	.	6	3	2	.
<i>Ficaria verna</i>	5	23	9	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	7	.
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	4	12	3	5	3	1	3	.	7	26	1	4	6	.	4	2	.	7
<i>Silene nutans</i>	13	2	4	32	1	.	.	.	.	13	1	.	.	.	2	.	.	20
<i>Digitalis grandiflora</i>	6	4	.	9	1	3	1	.	6	10	1	.	2	.	4	1	1	20
<i>Euphorbia cyparissias</i>	6	2	1	23	1	1	.	.	5	23	1	.	1	.	1	1	.	40
<i>Viola hirta</i>	9	.	2	36	.	1	.	.	2	8	.	.	.	.	2	.	1	27
<i>Hylotelephium telephium</i> agg.	5	.	1	32	1	1	1	.	1	3	1	.	2	.	5	.	2	40
<i>Galium mollugo</i> agg.	7	.	1	27	1	1	.	.	4	18	1	.	1	.	2	1	1	13
<i>Campanula rotundifolia</i> agg.	3	.	1	.	1	1	.	.	4	8	1	.	7	3	1	1	.	20
<i>Trifolium alpestre</i>	9	.	2	5	.	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Luzula sylvatica</i>	.	.	.	.	1	1	.	25	.	.	7	17	3	.	.	.	2	.
<i>Genista tinctoria</i>	6	.	5	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Galium pumilum</i> agg.	3	.	1	.	1	.	.	.	2	18	.	.	3	.	1	.	.	33
<i>Fallopia convolvulus</i>	4	.	1	23	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	1	.	13
<i>Crepis paludosa</i>	.	2	.	.	1	2	.	25	.	.	1	.	1	.	1	1	6	.
<i>Securigera varia</i>	3	.	1	14	1	.	.	.	1	3	.	.	.	.	1	.	.	20
<i>Cytisus nigricans</i>	2	.	3	9	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Pimpinella saxifraga</i>	2	.	2	.	.	.	.	.	.	13	1	.	.	.	.	.	.	20
<i>Inula conyzae</i>	1	.	.	.	1	.	.	.	1	10	.	.	.	.	1	1	.	20
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	1	.	.	5	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	1	.	20
<i>Teucrium chamaedrys</i>	1	.	.	5	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	27
<i>Seseli osseum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	27
<i>Festuca pallens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27
<i>Allium senescens</i> subsp. <i>montanum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Stachys recta</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20

Mechové patro***Primulo veris-Carpinetum betuli***

<i>Homalothecium philippeanum</i>	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
-----------------------------------	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae

<i>Ctenidium molluscum</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	1	19	.	6	.	.	1	1	.	.
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabulka 6 (pokračování ze strany 242)

Sloupec číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Calamagrostis villosae</i>-Fagetum sylvaticae																		
<i>Racomitrium sudeticum</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	13	.	.	.	.	.	.
<i>Vaccinio myrtilli</i>-Abietetum albae																		
<i>Leucobryum glaucum</i> s. l.	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	4	.	10	36	.	.	.	.
<i>Dicranum scoparium</i>	5	.	1	.	4	3	.	25	34	14	45	44	63	76	16	13	8	33
<i>Pleurozium schreberi</i>	5	3	1	6	2	1	.	.	17	.	4	.	45	70	3	.	1	42
<i>Bazzania trilobata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	7	30	.	.	.	.
<i>Seslerio albicantis</i>-Tilietum cordatae																		
<i>Cirriphyllum crassinervium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
<i>Peltigera praetextata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
<i>Ramalina capitata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	2	.	2	.	1	1	.	.	3	10	.	.	.	.	4	1	3	42
<i>Flavoparmelia caperata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
<i>Plagiochila porelloides</i>	2	.	.	.	1	1	.	.	3	14	1	.	6	3	3	4	3	25
<i>Anomodon attenuatus</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	17
<i>Solorina saccata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
<i>Barbilophozia barbata</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	17
<i>Encalypta streptocarpa</i>	1	.	.	.	.	1	.	.	.	14	.	.	.	.	1	.	.	17
<i>Hypnum cupressiforme</i> s. l.	21	7	14	39	18	10	11	.	45	38	50	19	57	58	27	31	16	75
Diagnostické druhy pro dvě a více asociací																		
<i>Eurhynchium angustirete</i>	1	.	1	.	1	1	.	.	37	.	1	.	29	9	6	8	13	.
<i>Dicranella heteromalla</i>	4	7	5	6	24	10	31	13	14	10	43	44	25	18	2	7	5	.
<i>Polytrichum formosum</i>	26	.	10	28	26	13	18	38	56	29	74	75	91	97	21	18	18	.
<i>Thuidium tamariscinum</i>	1	.	.	.	.	1	.	.	10	.	2	.	30	30	3	3	4	.
Ostatní druhy s vyšší frekvencí																		
<i>Atrichum undulatum</i>	33	17	33	11	24	22	20	.	36	5	21	6	23	3	23	22	24	17
<i>Plagiomnium affine</i> s. l.	12	.	4	.	1	3	.	13	60	5	3	.	53	18	17	12	14	.
<i>Pohlia nutans</i>	6	.	3	6	10	5	11	.	8	29	23	31	33	36	3	8	4	.
<i>Brachytheciastrum velutinum</i>	9	10	17	11	11	2	16	.	5	19	1	.	1	.	6	6	6	25
<i>Plagiomnium undulatum</i>	4	3	4	.	1	2	2	.	24	.	1	.	6	.	10	12	16	.
<i>Paraleucobryum longifolium</i>	.	.	.	.	2	2	.	.	3	.	20	19	10	12	2	13	3	.
<i>Hylocomium splendens</i>	3	.	.	.	1	1	.	.	19	5	3	.	27	27	5	4	3	33
<i>Rhizomnium punctatum</i>	3	7	1	.	.	3	2	13	8	.	4	13	2	.	6	14	20	.
<i>Tetraphis pellucida</i>	.	.	1	.	.	1	2	.	1	.	9	25	6	18	.	1	3	.

