

římskými legiemi. Aromatické plody jsou v našich klimatických podmínkách v syrovém stavu nepoživatelné (příliš trpké a tuhé), lze jich však použít k přípravě chutných kompotů a zavařenin; zvláště kdoulová pasta bývala oblíbenou pochoutkou. Kultivary: cv. Bereczki, cv. Champion, cv. Perská cukrová, cv. Coign de Portugal, cv. Coign d'An-

gers, cv. Leskovec, cv. Vranja, cv. Bourgeaut, cv. Favre, cv. Smyrna, cv. Konstantinople aj. Používá se i jako podnož pro některé odrůdy hrušní. Původní je v Íránu, Zakavkazí, Střední Asii a j. části Arabského poloostrova, zdomácněla na všech kontinentech kromě Austrálie. V ČR zplaněle v Praze, u Roudnice nad Labem a na j. Moravě.

## 2. *Choenomeles* LINDL. — kdoulovec\*)

*Choenomeles* LINDLEY Trans. Linn. Soc. London 13: 96, 97, 1821.

Opadavé keře s trnitými větvemi. Listy pilovité nebo vroubkované; palisty zveličelé, vytrvalé. Květy oboupohlavné i prašnickové, jednotlivé nebo po několika; objevují se před rašením listů nebo zároveň s nimi. Kalich opadavý; koruna červená; tyčinek 20–60; semeník spodní, čnělek 5, různé dlouhých, při bázi srostlých; vajíčka početná. Endokarp blanitý. — Čtyři druhy ve v. Asii.

1a Větve v mládí plstnaté; listy široce vejčité, tupé; koruna cihlově červená . . . 1. *C. japonica*  
b Větve v mládí lysé; listy vejčité podlouhlé, špičaté; koruna šarlatově červená . . . 2. *C. speciosa*

1. *Choenomeles japonica* (THUNB.) LINDL. ex SPACH — kdoulovec japonský

*Choenomeles japonica* (THUNBERG) LINDLEY ex SPACH Hist. Natur. Vég. Phanér. 2: 159, 1834. — Syn.: *Pyrus japonica* THUNB. Fl. Jap. 207, 1784. — *Cydonia japonica* (THUNB.) PERS. Syn. Pl. 2: 46, 1807.

Keř až 1 m vys. Větve rozestálé, v mládí hustě plstnaté, později olysávající. Listy široce vejčité, tupé, hrubě pilovité, po obou stranách lysé, 3–5 cm dl. Květy po 2–4, cihlově červené, asi 3 cm v průměru. Malvice ± kulovitá, žlutozelená, 4–5 cm v průměru, vonná. IV–V. Ff.

Často pěstován pro okrasu v zahradách a parcích v kultivarech cv. Dwarf Poppy Red, cv. Orange Beauty a cv. Sargentii. Řidčeji pěstován je cv. Tricolor; podrobnější přehled pěstovaných forem uvádí WEBER *Arnoldia* 23: 17–75, 1963. Původní v Japonsku, k nám introdukovan v r. 1865.

2. *Choenomeles speciosa* (SWEET) NAKAI — kdoulovec ozdobný

*Choenomeles speciosa* (SWEET) NAKAI Jap. Bot. 4: 331, 1929.

Keř až 2 m vys. Větve ± vzpřímené, i v mládí lysé. Listy vejčité podlouhlé, špičaté, ostře, jemně pilovité, po obou stranách lysé, 3–6 cm dl. Květy jednotlivé nebo po několika, šarlatově červené (výjimečně bílé), 3–4 cm v průměru. Malvice ± kulovitá, žlutozelená až načervenalá, 4–6 cm v průměru, vonná. — IV–V. Ff.

Často pěstován pro okrasu v zahradách a parcích v rozmanitých kultivarech (příklady: bělokvětý cv. Apple Blossom, plnokvětý cv. Atrococcinea Plena, dále cv. Atrosanguinea, cv. Brilliant, cv. Contorta, cv. Marmorata, cv. Snow aj.). Původní v Japonsku, k nám introdukovan v r. 1927.

Poznámka: Řidčeji se pěstuje také kříženec obou druhů *C. × superba* (FRAHM) REHDER.

## 3. *Pyrus* L. — hrušeň\*\*)

*Pyrus* LINNAEUS Sp. Pl. 479, 1753 emend. MILLER Gard. Dict., ed. 4, sine p., 1754.

Lit.: WITASEK J. (1904) Über die Herkunft von *Pirus nivalis* Jacq. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 54: 621–630. — ŘÍHA J. (1937): České ovoce I, ed. 3. Praha. — DOMIN K. (1946): Třídění hrušní planých i pěstovaných [*Pirus communis* L. subsp. *piraster* (L.) a *domestica* (Lam. et DC.)] s hlediska soustavné botaniky. Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., cl. math.-natur., 32 (1944): 1–15. — FEDOROV An. A. (1954): Gruša — *Pyrus* L. In: SOKOLOV S. Ja. [red.], *Derevja i kustarniki SSSR* 3: 378–414. Moskva et Leningrad. — TERPÓ A. (1960): Magyarország vadkörtéi. Kert. és Szőlés. Főisk. Ékv. 22/6/2: 3–258. — UHLÍK J. (1961): The cytological evaluation of some pear-sorts cultivated in Czechoslovakia. Biol. Pl. 3: 205–214. — ZWINTZSCHER M. et SIEBS E. (1962): Birne. In: KAPPERT H. et RUDOLF W. [red.], *Handbuch der Pflanzenzüchtung* 6, ed. 2, p. 695–722. Berlin et Hamburg. — AMARAL FRANCO J. DO et ROCHA AFONSO M. L. DA (1965): Das pereiras bravas Portuguesas. Rev. Fac. Ci., ser. 2C, 12/2: 175–213. — ZIELINSKI Q. B. et THOMPSON M. M. (1967): Speciation in *Pyrus*: Chromosome number and meiotic behaviour. Bot. Gaz. 128: 109–112. — KOCH V., BLATTNÝ C., BLAHA J. et KALAŠEK J. (1967): Hrušky. Praha. — CHALLICE J. S. et WESTWOOD M. N. (1973): Numerical taxonomic studies of the genus *Pyrus* using both chemical and botanical characters. Bot. J. Linn. Soc. 67: 121–148. — DOSTÁLEK J. (1979): Jsou na území Československa reliktní hrušně (*Pyrus*) ze sekce *Pashia*?

\*) Zpracoval M. Kovanda

\*\*\*) Zpracoval J. Dostálek